

**სამკურნალო ღონისძიებები ტყვიის ტოქსიური ზემოქმედების გამოვლენისა და მართვის სახელმწიფო პროტოკოლის მიხედვით**

**0-5 მკგ/დლ.**

- 1) არ საჭიროებს თერაპიურ ღონისძიებებს.
- 2) განმეორებითი კვლევა 3-6 თვის ვადაში.

**5 – 9.99 მკგ/დლ.**

- 1) განმეორებითი ტყვიის კვლევა 30 დღის ვადაში.
- 2) დამატებით ლაბორატორიული კვლევები: ა) სისხლის საერთო ანალიზი. ბ) ფერიტინი. გ) C-რეაქტიული ცილა.
- 2) რკინის, კალციუმის და მულტივიტამინების შემცველი პრეპარატები.
- 3) კვებითი სტატუსისა და გლობალური განვითარების შეფასება.

**10-34.9 მკგ/დლ.**

- 1) დამატებით ლაბორატორიული კვლევები: ა) სისხლის საერთო ანალიზი, ბ) ფერიტინი, გ) C - რეაქტიული ცილა.
- 2) რკინის, კალციუმის და მულტივიტამინების შემცველი პრეპარატები.
- 3) კვებითი სტატუსისა და გლობალური განვითარების შეფასება.
- 4) ტყვიის განმეორებითი კვლევა 1-4 კვირის ვადაში.

**35-59.9 მკგ/დლ.**

- 1) ექსპერტ-ტოქსიკოლოგის კონსულტაცია.
- 2) განმეორებითი ტესტირება ტყვიაზე 48სთ-ში.
- 3) დამატებით ლაბორატორიული კვლევები - ა) სისხლის საერთო ანალიზი. ბ) ფერიტინი. გ) C - რეაქტიული ცილა. დ) რკინა სისხლში. ე) ჰემატინი შარდში. ვ) მუცლის ღრუს რენტგენოგრაფია.