

0-7 წლამდე ბავშვებში ტყვიის ტოქსიური ზემოქმედების ადრეული გამოვლენის კომპონენტი

პაციენტის სახელი და გვარი _____

პირადი ნომერი (11 ნიშანი) _____

მისამართი _____

დაბადების თარიღი: _____

საკონტაქტო პირი N1 _____

ტელეფონი _____

საკონტაქტო პირი N1 _____

ტელეფონი _____

ელექტრონული ფოსტა _____

წონა ____ კგ სიმაღლე ____ სმ კითხვარის შევსების თარიღი ____ ____ 2020

ტყვიის ინტოქსიკაციის პირველადი ნიშნები (გახაზეთ ერთი ან რამდენიმე მახასიათებელი)

- ქცევითი პრობლემები: ადვილად გაბრაზება, გაღიზიანებადობა, ხასიათის ცვლილებები
- დსწავლის პრობლემები.
- ზრდის ტემპის შენელება
- სმენის ან მეტყველების პრობლემები
- თავის ქრონიკული ტკივილი
- ანემია
- მადის დაკარგვა
- მადის გაუკუღმართება
- მუცლის ქრონიკული ტკივილი
- შეკრულობა
- ღებინება
- ადვილად დაღლილობა, მოდუნება, ზოგადი სისუსტე
- ძილის პრობლემები
- ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიურობის სინდრომი
- კონცენტრირების უნარის დაქვეითება
- ცისფერი ელფერი ღრძილების გარშემო
- ტყვიის ნეფროპათია: ჰიპერტენზია
- ალოპეცია ან კანის, ფრჩხილების აქერცვლა
- ტყვიის ექსპოზიციის სხვა ნიშნები

ექიმის სახელი და გვარი _____