ორსულ და ლაქტაციის პერიოდში მყოფ ქალებში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრა:

პაციენტის სახელი და გვარი: _____

პირადი ნომერი: _____

მისამართი: _____

ტელეფონი: _____

ელ.ფოსტა: _____

○ პირველადი ორსულობა: ○ განმეორებითი ორსულობა

ორსულობის კვირა: _____

შევსების თარიღი: _____

ინტოქსიკაციის პირველადი ნიშნები:

- სისუსტე, ენერგიის ნაკლებობა, დაღლილობა
- ძილისდარღვევა, ინსომნია
- შფოთვა, ქცევითი აშლილობა, ნევროზი.
- ცუდი მეხსიერება, ცნობიერების დაბინდვა.
- უმადობა
- მეტეორიზმი
- კოლიკა
- ყაბზობა
- ტაქტილური მგრძნობელობის დაქვეითება
- პარესთეზიები
- თავბრუსხვევა
- ტრემორი, ჰალუცინაციები
- სახსრების და კუნთების ტკივილი
- წონაში კლება
- ჰიპერტენზია
- გემოვნების დარღვევა, მეტალის გემო
- ჰიპერსალივაზია, გულისრება-ღებინება
- შარდვის შეკავება
- ფერმკრთალი კანი
- დეპრესია
- დაბალი ტემპერატურა, ცივი ოფლი
- ტაქიკარდია, სისხლძარღვთა უკმარისობა

ექიმის სახელი და გვარი _____